Cedrus deodara

Caratteristiche botaniche:

Nome comune: Cedro deodara o dell'Himalaya
Famiglia: Pinaceae
Pianta monoica/dioica: monoica
Portamento: arboreo
Foglie: persistenti, aghiformi, con aghi riuniti in fascetti o a gruppi di 20 – 35 elementi, inseriti sui brachiblasti a loro volta posti sui rami di maggiore dimensione. Gli aghi sono più lunghi di quelli degli altri cedri, sono di colore verde più o meno intenso e meno rigidi di quelli degli altri cedri
Fiori: fiori maschili viola, femminili verdi, sulla stessa pianta in autunno
Frutti: strobili a forma di barile, viola marrone a maturità
Fruttifica appena all'età di 30-40 anni
Periodo di dispersione del polline: G F M A M G L A S O N D
Impollinazione: anemofila

Rischio Allergologico

Valido anche per: C. libani, C. brevifolia
Articoli trovati: 8
Qualità dell'evidenza per:
sensibilizzazione: moderata
pollinosi: bassa
Contributo dell'opinione degli esperti: rilevante
Rischio: possibile
Forza della raccomandazione: bassa
***Raccomandazione*:**
La piantagione in città di *Cedrus deodara* dovrebbe essere limitata a pochi esemplari e/o evitando i luoghi sensibili, dato che la pollinosi da Cedro deodara è stata descritta come importante nella regione dell'Himalaya dove queste piante crescono in abbondanza.
Allergeni nel database IUIS: no
Note: La sensibilizzazione clinicamente rilevante a Cedrus deodora è importante sia nel territorio himalaiano sia nella città di Delhi.
Bibliografia: 20, 47, 106