

Taxus cuspidata ////////////////

Caratteristiche botaniche:

Nome comune: Tasso giapponese

Famiglia: Taxaceae

Pianta monoica/dioica: dioica

Portamento: arbustivo/arboreo

Foglie: lanceolate, piatte, di colore verde scuro, lunghe 1-3 cm, spiralate lungo il rametto

Fiori: fiori piccoli e poco appariscenti, riuniti in infiorescenze alla base delle foglie, i femminili sono di colore verdastro, i maschili di colore giallastro

Frutti: arillo, "falso frutto" costituito dal seme avvolto da una struttura carnosa di colore rosso lunga fino a 1 cm; i "frutti" sono prodotti solo dalle piante femminili, maturano 6-9 mesi dopo l'impollinazione

Periodo di dispersione del polline: **G F M A M G L A S O N D**

Impollinazione: anemofila

Rischio Allergologico:

Valido anche per: altre specie di Taxus (T. brevifolia, T. canadensis, ecc.)

Articoli trovati: 57

Qualità dell'evidenza per:

sensibilizzazione: bassa

pollinosi: non valutabile

Contributo dell'opinione degli esperti: rilevante

Rischio: non evidente

Forza della raccomandazione: bassa

Raccomandazione:

Manca l'evidenza che il polline di *Taxus cuspidata* possa essere responsabile di una sensibilizzazione allergica con o senza rilevanza clinica, pertanto la piantagione in città di questa specie non sembra costituire un rischio per le allergie respiratorie.

Allergeni nel database IUIS: no

Note: su 3057 pazienti pollinosici, sottoposti a cutireazioni con un pannello di sette cupressacee e taxodiacee, il potere sensibilizzante di *taxus baccata* si è confermato modesto.

Bibliografia: 290, 291

